

**FUNGICIDA AD AZIONE CITOTROPICA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI
(WG)**

100



Coltura	Avversità	Dose (kg/ha) min - max	Dose (g/hL)	Indicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
VITE DA VINO E DA TAVOLA	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)*, Antracnosi (<i>Elsinoe ampelina</i> , <i>Colletotrichum</i> spp.)	2,8 - 3,0	280 - 300	Impiegare dalla formazione dei germogli fino al virare di colore degli acini* Numero trattamenti/anno: 4 Intervallo minimo: 7 giorni	28
POMODORO (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas</i> spp.; <i>Xanthomonas</i> spp.)	2,8 - 3,0	280 - 300	Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie vere fino al 50% di frutti maturi. Numero trattamenti/anno: 6 Intervallo minimo: 7 giorni	3 (pomodoro da mensa) 10 (pomodoro da industria)
ZUCCHINO (in campo)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas</i> spp.; <i>Xanthomonas</i> spp.)	2,8 - 3,0	280 - 300	Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie vere fino a quando il 10% dei frutti mostra la tipica colorazione Numero trattamenti/anno: 4 Intervallo minimo: 7 giorni	7
PATATA (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas</i> spp.; <i>Xanthomonas</i> spp.)	2,8-3,0	280 - 300	Impiegare dal primo getto basale fino al 50% di foglie brunastre Numero trattamenti/anno: 5 Intervallo minimo: 7 giorni	14
AGLIO, CIPOLLA (in campo)	Peronospora (<i>Peronospora destructur</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas</i> spp.; <i>Xanthomonas</i> spp.)	2,8 - 3,0	280 - 300	Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie vere fino all'inizio della bulbificazione Numero di trattamenti/anno: 4 Intervallo minimo: 7 giorni	7
ROSA (in campo)	Peronospora (<i>Peronospora</i> sp.)	2,8 - 3,0	280 - 300	Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie sul tronco principale fino ad inizio fioritura. Numero trattamenti/anno: 3 Intervallo minimo: 7 giorni	--

Per l'impiego con irratrici a recupero di volume, e nel caso della vite nelle prime fasi di sviluppo o in allevamento ove, per una corretta bagnatura della vegetazione, sia sufficiente una minore quantità d'acqua rispetto ai Volumi Normali (VN)

sopraindicati (es. vite fino alla fase di fioritura), si suggerisce di fare riferimento alla sola dose in grammi per ettolitro (g/hL), avendo ovviamente cura di non superare la dose massima ad ettaro.

UTILIZZO DEL PRODOTTO: versare CIMORAM ULTRA WG direttamente nella botte riempita per $\frac{3}{4}$ con acqua mantenendo l'agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente attivare l'agitatore.

COMPATIBILITÀ: CIMORAM ULTRA WG è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di non usare CIMORAM ULTRA WG in associazione con prodotti a reazione alcalina. In caso di dubbio si consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Si consiglia di effettuare saggi preliminari in caso di impiego su nuove varietà o di miscela con altri prodotti fitosanitari.

INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: Riferirsi all'intervallo di sicurezza riportato in tabella.

ATTENZIONE Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente