



CIMORAM ULTRA WG

FUNGICIDA AD AZIONE CITOTROPICA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

- efficace contro: Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria, Batteriosi
- Bassissimo apporto di rame per ettaro.
- La nuova formulazione microgranulare ad **elevatissima micronizzazione** e superiore dispersione in acqua consente di ridurre notevolmente l'apporto di rame e di garantire una notevole copertura della vegetazione.
- Particolarmente indicato per le applicazioni **a bassi e ultrabassi volumi** di acqua, aderisce perfettamente alle superfici verdi.
- **Resiste al dilavamento** in maniera superiore ai formulati della stessa categoria.



In ottemperanza al comunicato 31 Gennaio 2019 e successive rettifiche, recante il Reg. (UE) n°2019/1981 relativo ai formulati rameici.



Applicazione
sulla pianta



COMPOSIZIONE

RAME metallo (da poltiglia bordolese)	g 20
CIMOXANIL puro	g 4



REGISTRAZIONE

n. 15101 del 18/03/2011



CLASSIFICAZIONE

CLP



H319, H361fd, H410



FORMULAZIONE

Microgranuli idrodispersibili (WG)



CONFEZIONI

kg 1 (Cartone: 10x1) - kg 10 (Cartone: 2x5)



CARENZA

3 giorni: Pomodoro da mensa.
10 giorni: Pomodoro da industria.
7 giorni: Zucchini, Aglio, Cipolla.
14 giorni: Patata.
28 giorni: Vite da Vino e tavola.



MISCIBILITA' E AVVERTENZE

CIMORAM ULTRA WG è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di non usarlo in associazione con prodotti a reazione alcalina. In caso di dubbio si consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala.



COLTURE

PATOGENI



DOSE (g/hL)



NOTE

VITE DA VINO E DA TAVOLA	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)*, Antracnosi (<i>Elsinoe ampelina</i> , <i>Colletotrichum spp.</i>)	280 - 300	Impiegare dalla formazione dei germogli fino al virare di colore degli acini. Numero trattamenti/anno: 4 Intervallo minimo: 7 giorni * Le applicazioni andranno effettuate secondo un criterio "preventivo".
POMODORO (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i>)	280 - 300	Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie vere fino al 50% di frutti maturi. Numero trattamenti/anno: 6 Intervallo minimo: 7 giorni
ZUCCHINO (in campo)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i>)	280 - 300	Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie vere fino a quando il 10% dei frutti mostra la tipica colorazione. Numero trattamenti/anno: 4 Intervallo minimo: 7 giorni
PATATA (in campo)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i>)	280 - 300	Impiegare dal primo getto basale fino al 50% di foglie brunastre. Numero trattamenti/anno: 5 Intervallo minimo: 7 giorni
AGLIO, CIPOLLA (in campo)	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>), Batteriosi (<i>Pseudomonas spp.</i> ; <i>Xanthomonas spp.</i>)	280 - 300	Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie vere fino all'inizio della bulbificazione. Numero di trattamenti/anno: 4 Intervallo minimo: 7 giorni
ROSA (in campo)	Peronospora (<i>Peronospora sp.</i>)	280 - 300	Impiegare dallo stadio di 3-4 foglie sul tronco principale fino ad inizio fioritura. Numero trattamenti/anno: 3 Intervallo minimo: 7 giorni

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.