

Calcium Fast

Linea Fast calcio a rapido assorbimento fogliare

Previene e cura le carenze di calcio.

A base di Chelato di Calcio.



Componenti: Chelato di calcio.

Modalità d'azione e vantaggi agronomici: CALCIUM FAST è un formulato liquido a base calcio in forma chelata, è caratterizzato da un'elevata capacità di assorbimento a livello fogliare, dimostrando la massima efficacia nel contrastare le fisiopatie causate dalla carenza di calcio e nell'aumentare la consistenza e la conservabilità di frutta e ortaggi.

CALCIUM FAST è indicato in particolare per risolvere rapidamente le seguenti fisiopatie:

- butteratura amara delle mele
- disseccamento del rachide della vite
- marciume apicale del pomodoro
- seccume fisiologico del melone
- seccume fogliare degli ortaggi da foglia
- mal raggiante, cracking e rugginosità delle drupacee
- necrosi marginale delle brattee della poinsettia

Analisi e proprietà chimico-fisiche:

Chelato di calcio

30%

pH 0.1%	EC 0.1% mS/cm	Densità g/ml
5.98	0.16	1.18

Taglia: 1 L; 5 L

Metodo di applicazione: FOGLIARE

Sulle colture orticole da frutto e frutticole iniziare i trattamenti da frutto ingrossato e proseguire sino a poco prima della raccolta.

Colture	Dose	Indicazioni
Vite e colture frutticole in genere	100 - 120 ml/hl	3 - 4 trattamenti da ingrossamento frutto
Melo varietà Golden e simili	50 - 60 ml/hl	4 - 5 trattamenti da caduta petali
Melo varietà rosse	80 - 120 ml/hl	4 - 5 trattamenti da caduta petali
Ortaggi a pieno campo	80 - 120 ml/hl	Dalle fasi di post allegagione ogni 10 - 12 giorni
Ortaggi in serra	100 - 120 ml/hl	Dalle fasi di post allegagione ogni 10 - 12 giorni
Vivai	80 - 100 ml/hl	Dalle prime fasi di sviluppo ogni 12 - 15 giorni
Piante ornamentali e da fiore	80 - 100 ml/hl	Dalle prime fasi di sviluppo ogni 12 - 15 giorni

In applicazione fogliare si consiglia di utilizzare volumi di acqua, per singola applicazione, non inferiori ai 500 - 600 l/ha su colture arboree, di 150 - 300 l/ha su colture industriali ed erbacee da pieno campo, e di 80 - 100 l/1000 mq su colture in serra.

Fertirrigazione con manichetta: 2 - 3 litri /1000 mq da post-allegagione. Ripetere per 3 - 4 volte con intervalli di 10 - 15 giorni.

Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi e devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo-climatiche.

Miscibilità: CALCIUM FAST è miscibile alla dose d'impiego con i prodotti CIFO e con gli antiparassitari in genere, in tutti i casi è buona norma controllare sulle etichette le indicazioni di compatibilità riportate.

Al sensi dell'art. 48 del Regolamento CE 1272/2008 (CLP), prima di concludere il contratto d'acquisto si richiede di prendere visione dei pericoli associati al prodotto nella tabella dedicata a fine catalogo. Poiché la classificazione dei prodotti può subire variazioni nel corso del tempo, per eventuali aggiornamenti si rimanda al seguente link: <https://bit.ly/2PXXyKf>