



ALBENE

INSETTICIDA A BASE DI OLIO DI PARAFFINA I (EMULSIONE OLIO IN ACQUA)

- Agisce per contatto e per asfissia.
- Particolarmente indicato nella lotta alle Cocciniglie o Diaspini, e le forme svernanti o primaverili-estive degli Acari.
- Attività abbattente nei trattamenti invernali, ad alti dosaggi.
- Come coadiuvante dei trattamenti estivi, a bassi dosaggi.



Applicazione sulla pianta



COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)

OLIO DI PARAFFINA CAS 8042-47-5 g 78,1 (= 654 g/l)



REGISTRAZIONE

n. 0206 del 20/11/1971



CLASSIFICAZIONE

CLP



H411



FORMULAZIONE

Emulsione concentrata



CONFEZIONI

1 litro (Cartone: 12x1)
5 litri
25 litri
1000 litri



CARENZA

20 giorni



MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Impiegare ALBENE con un intervallo di almeno 20 giorni dopo aver effettuato trattamenti con poltiglia bordolese, polisolfuri e prodotti contenenti captano, zolfo, tiram. Su piante ornamentali, data la notevole varietà di specie presenti, si consiglia di effettuare saggi preliminari prima di trattare l'intera superficie.



CULTURE



PATOGENI



DOSE



NOTE

| CULTURE | PATOGENI | DOSE | NOTE |
|--------------------|---|--|---|
| POMACEE | Cocciniglie (<i>Q. Perniciosus</i> , <i>E. leperii</i> , ecc.), Afidi (<i>A. pomi</i> , <i>D. plantaginea</i> , <i>D. pyri</i> , ecc.), Acari (<i>P. ulmi</i>). | 0,75-1,0 l/hl (10,0 L/ha impiegare volumi di acqua di 800-1000 L/ha). | Nei trattamenti di fine inverno-inizio primavera fino alla pre-fioritura, normalmente in corrispondenza della fase fenologica delle orecchiette di topo del melo e dei "mazzetti affioranti" per il pero. Effettuare 1 trattamento/anno. |
| DRUPACEE | Cocciniglie (<i>P. pentagona</i> , <i>Q. perniciosus</i> , <i>E. corni</i> , ecc.), Afidi (<i>Myzus spp.</i> , <i>H. amygdali</i> , <i>Brachycaudus spp.</i> , ecc.), Ragnetto rosso (<i>P. ulmi</i>). | 0,75-1,0 L/hl (10,0 L/ha distribuire con un volume di 800-1000 L/ha di acqua). | Nei trattamenti di fine inverno, normalmente dalla fase fenologica di "gemma rigonfia" a "bottoni rosa". Effettuare 1 trattamento/anno. |
| AGRUMI | Cocciniglie (<i>C. hesperidium</i> , <i>S. oleae</i> , <i>P. pergandei</i> , <i>A. aurantii</i> , <i>I purchasi</i> , <i>Ceratoplastes spp.</i> , ecc.) e la mosca bianca (<i>Dialeurodes citri</i> , <i>Aleurothrix floccosus</i> , ecc.s) | 1,0-1,5 L/hl (20-45 L/ha impiegare volumi di acqua di 2000-3000 L/ha). | Nei trattamenti invernali e primaverili-estivi fino all'ingrossamento dei frutti. Effettuare massimo 2 interventi/anno con un intervallo di almeno 14 giorni. |
| VITE | Cocciniglie (<i>T. vitis</i> , <i>P. vitis</i> , ecc.), Ragnetto rosso (<i>P. ulmi</i>), Ragnetto giallo (<i>E. carpini</i>), Afidi. | 1,0 L/hl (5,0-12 L/ha distribuendo un volume di 500-1200 L/ha di acqua). | Nei trattamenti di fine inverno-inizio primavera (fino all'ingrossamento delle gemme). Effettuare 1 trattamento/anno. |
| PIANTE ORNAMENTALI | Cocciniglie (<i>P. pentagona</i> , ecc.) e il Ragnetto rosso (<i>T. urticae</i> , <i>P. ulmi</i>), Afidi. | 1,0-2,0 L/hl (4,0-40,0 L/ha impiegando volumi di acqua di 400-2000 L/ha). | Nei trattamenti invernali e alla ripresa vegetativa. Effettuare massimo 2 trattamenti/anno. |